

Metodi ormonali

IMPIANTO SOTTOCUTANEO

Bastoncino flessibile, in materiale sintetico contenente un ormone progestinico

Durata di 3 anni

Inserimento da parte del/della ginecologo/a


Ciclo irregolare, possibile assenza di mestruazioni

400-450 franchi più la posa

Possibile uso durante l'allattamento

Sicurezza molto alta

Non protegge dalle infezioni sessualmente trasmissibili



COSS e FSL-TI

COM'È FATTO?

È un piccolo bastoncino flessibile, in materiale sintetico, lungo 4 cm e con diametro di 2 mm (come un fiammifero).

COSA CONTIENE?

Ormone progestinico.

COME SI USA?

Il/la ginecologo/a inserisce l'impianto sotto la pelle del braccio con un applicatore, tramite una piccola incisione effettuata dopo un'anestesia locale. A scadenza o in caso di desiderio di gravidanza, viene rimosso dal/dalla ginecologo/a.

QUANDO CI SI DEVE PENSARE?

Ogni 3 anni.

COME FUNZIONA?

- Impedisce l'ovulazione
- Diminuisce la crescita dell'endometrio
- Modifica il muco cervicale e impedisce il passaggio degli spermatozoi

È COMPATIBILE CON L'ALLATTAMENTO?

Questo metodo è compatibile con l'allattamento, anche nell'immediato post parto. L'ormone progestinico non interferisce con l'allattamento e di conseguenza con la crescita del/della bambino/a.

QUANDO L'EFFICACIA PUÒ DIMINUIRE?

- Peso corporeo superiore agli 80 kg
- Assunzione di medicinali (antibiotici, antiepilettici...) o iperico/erba di San Giovanni

HA EFFETTI COLLATERALI?

È possibile avere sanguinamenti irregolari, acne, tensione al seno, ...

Per ulteriori informazioni [clicca qui](#).